LZ-Rheinland

Artikel vom 23.02.2022 · Ausgedruckt am 11.11.2026, 13:06 Uhr

Online: https://lz-rheinland-staging.p-k3txh2.project.space/nachricht/schaedlingssaison-beginnt-mit-staengelruesslern

Schädlingssaison beginnt mit Stängelrüsslern



Foto: imago/Panthermedia

In den vergangenen zwei Jahren startete der Zuflug der Stängelrüssler bereits im Februar. Schon zwei bis drei sonnige und warme Tage mit frühlingshaften Temperaturen um 12 °C locken Große Rapsstängelrüssler und Gefleckte Kohltriebrüssler aus ihren Winterquartieren. Sie fliegen in die jungen Rapsbestände. Worauf Sie jetzt achten müssen, erklärt Ursula Furth, Landwirtschaftskammer NRW.

Wenn diese Bedingungen zu erwarten sind, müssen Gelbschalen im Raps stehen. Nur mit Gelbschalen lässt sich der Zuflug der Kohltriebrüssler und der Stängelrüssler erfassen. Wer den Zuflug verpasst und nicht rechtzeitig eine Insektizidmaßnahme gegen die Käfer zur Verhinderung der Eiablage durchführt, kann den durch Kohltriebrüssler und Stängelrüssler verursachten Schaden nicht mehr verhindern.

Ob es sich um den Großen Rapsstängelrüssler oder um den Gefleckten Kohltriebrüssler handelt, ist durch folgende Unterschiede im Aussehen zu erkennen:

· Großer Rapsstängelrüssler: zwischen 2,5 und 3 mm groß, durch feine Behaarung grau wirkend, Füße schwarz gefärbt

· Gefleckter Kohltriebrüssler: kleiner als der Große Rapsstängelrüssler, weißer Fleck auf dem Rücken, rötliche Füße – im trockenen Zustand gut zu erkennen

Mehr in LZ 8-2022 ab S. 26